

LYRICA®:150mg

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della farmacia vaticana-per l'uso interno)

Il principio attivo è Pregabalin. 1 capsula rigida contiene 150 mg di Pregabalin.

Eccipienti: lattosio- monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, ossido di titanio (E 171), sodio-dodecil-solfato, ossido di silicio altamente disperso, stampa in colore nero (contiene Schellack, ossido di ferro (II,III) (E 172), glicolo di propilene, idrossido di potassio) e acqua.

Proprietario: Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, U.K..

Produttore: Pfizer GmbH Arzneimittelwerk Gödecke, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germania.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia S.d. Via Valbondione,113 I-00188 Roma; Tel: +39 06 33 18 21

1. CHE COSA E' LYRICA E PER CHE COSA ESSA VIENE UTILIZZATA?

LYRICA appartiene al gruppo di farmaci, utilizzati per il trattamento di epilessia e di dolori di origine neuropatica.

Nei dolori neuropatici: LYRICA serve per il trattamento dei dolori cronici, causati dai danni a carico dei nervi. I dolori neuropatici periferici possono essere originati da diverse malattie, come ad esempio diabete, o fuoco di san Antonio (herpes zooster). Il dolore percepito può essere descritto come caldo, bruciante, pulsatorio, come da uno sparo, penetrante, acuto, crampiforme, muscolare, formicolare, sordo o puntiforme.

I dolori periferici possono anche essere accompagnati da oscillazioni dell'umore, disturbi del sonno o stanchezza ed influire sulle funzioni fisiche e sociali come sulla qualità della vita. La sicurezza e l'efficacia di Pregabalin nei pazienti sotto 18 anni affetti da dolori neuropatici cronici non sono state studiate

In epilessia: Con la LYRICA viene trattata una certa forma di epilessia di età adulta (attacchi parziali con o senza una generalizzazione secondaria). Il Suo Medico Le prescrive la LYRICA per coadiuvare la terapia, se il trattamento in corso risulta insufficiente. Deve assumere LYRICA in aggiunta ai farmaci che già sta prendendo. LYRICA non è stata concepita per la monoterapia, ma deve essere sempre impiegata in combinazione con altri antiepilettici.

2. DI CHE COSA BISOGNA TENER CONTO PRIMA DI USARE LYRICA?

LYRICA non può essere assunta

-se Lei è ipersensibile (allergico) a Pregabalin o qualsiasi altro componente di LYRICA.

In corso di terapia con la LYRICA si richiede particolare prudenza in quanto il farmaco può dare sonnolenza e stordimento, che soprattutto nel paziente anziano può portare frequentemente a cadute accidentali con rischio di conseguente lesioni traumatiche. Si richiede perciò la prudenza fino a quando il paziente non si sia abituato agli effetti del farmaco.

In alcuni pazienti diabetici che in corso di trattamento con Pregabalin aumentano di peso, può essere necessario adeguare la posologia della terapia antidiabetica.

Sull'assunzione di LYRICA con il cibo o le bevande:

Le capsule di LYRICA possono essere prese sia con il cibo sia a digiuno.

Si raccomanda di non assumere LYRICA con le bevande alcoliche.

LYRICA non può essere assunta in gravidanza, se il Suo Medico non glielo abbia espressamente ordinato. Le donne che potrebbero andare incontro alla gravidanza, devono utilizzare una contraccezione efficace. Chieda immediatamente il consiglio al Suo Medico, se durante il trattamento con la LYRICA diventa gravida o presume di esserlo o progetta una gravidanza. Chieda il consiglio al Medico o al Farmacista prima di assumere qualsiasi farmaco.

Allattamento: Siccome non si sa se LYRICA viene escreta nel latte materno, durante il trattamento con il prodotto si sconsiglia di allattare al seno. Durante l'allattamento chieda il consiglio al Medico o al Farmacista prima di assumere qualsiasi farmaco.

Capacità di guida degli automobili e utilizzo delle macchine: LYRICA può rendere la persona intontita, sonnolenta e distratta. Ci si dovrebbe astenere dalla guida dell'auto e dall'utilizzo di macchinari complessi o da altre potenzialmente pericolose attività, fino a quando non si abbia constatato che il farmaco non influenza queste attività.

Informazioni importanti circa certi componenti di LYRICA:

Se il suo Medico le ha detto che ha intolleranza verso alcuni zuccheri, prima di prendere questo farmaco ne parli con il Medico. Nel corso di una terapia con il farmaco prima di prendere qualsiasi altro medicinale deve parlare con il suo Medico.

Assunzione di LYRICA con altri farmaci: prima di prendere qualsiasi altro medicinale con LYRICA deve parlare con il suo Medico. Informi il suo Medico o il Farmacista se poco prima di assumere LYRICA abbia preso altri farmaci, anche se dovesse trattarsi delle specialità da banco.

LYRICA e certi altri farmaci possono influenzarsi a vicenda (così dette interazioni). Lo stordimento, la sonnolenza e la perdita di concentrazione possono rafforzarsi se prende LYRICA assieme ai farmaci che contengono: ossicodone (analgesico); lorazepam (ansiolitico)

LYRICA può essere assunta assieme alla pillola contraccettiva.

3. COME ASSUMERE LYRICA?

Prenda LYRICA sempre seguendo esattamente le indicazioni del Medico. Se ha dei dubbi, chieda il parere al suo Medico o al Farmacista. Il suo Medico decide il dosaggio più adatto per Lei.

Il dolore periferico di origine neuropatica o epilessia: Prenda il numero prescritto di capsule, seguendo la prescrizione del Medico. Di solito la posologia è tra 150 mg e 600 mg al giorno. Il Medico Le spiegherà, se prendere LYRICA due o tre volte al giorno. Se si opta per due somministrazioni giornaliere, prenda LYRICA una volta al mattino e una volta alla sera, tutti i giorni all'incirca alla stessa ora. Parli con il suo Medico o il Farmacista se ha l'impressione che il farmaco abbia l'effetto troppo forte o troppo debole. Se ha compiuto oltre 65 anni di vita e non ha problemi renali, prenda LYRICA normalmente. Se soffre di nefropatie, il suo Medico può ordinare un altro ritmo di assunzione o un altro dosaggio. Deglutisca la capsula intera con l'acqua. Continui a prendere il farmaco fino a quando il Medico non decida di sospendere.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini e adolescenti (sotto i 18 anni) non è stata studiata. Perciò il Pregabalin non viene utilizzato per queste categorie di età.

Se ha assunto una quantità di LYRICA maggiore di quella prescritta, si rivolga subito al suo Medico o al Farmacista o chiami l'ambulanza del centro sanitario più vicino. Prenda con sé la sua scatola di LYRICA.

Quando ci si dimentica di prendere LYRICA

E' importante assumere LYRICA regolarmente, tutti i giorni alla stessa ora.

Se dovesse dimenticarsi di prendere una dose, la prenda non appena se ne abbia accorto. Se è già l'ora di prendere la dose successiva, la prenda normalmente. Non prendere una dose doppia per sopperire ad una somministrazione dimenticata. Effetti alla sospensione della terapia: concludere la terapia solo dietro il consiglio Medico. La sospensione (ndt. graduale) deve durare almeno una settimana.

4. QUALI EFFETTI AVVERSI SONO POSSIBILI?

Come tutti i farmaci, anche LYRICA può causare effetti collaterali.

Effetti avversi molto frequenti, che possono comparire in più di 1 persona su 10 sono:

stordimento, stanchezza,

Effetti avversi frequenti, che possono comparire in più di 1 persona su 100 sono:

- aumento di appetito, euforia, confusione, alterazioni delle pulsioni sessuali, eccitabilità, calo di attenzione, letargismo, disturbi del pensiero, tremori, difficoltà nel parlare, dispercezioni come formicolii, •abbassamento della vista (vista non nitida), strabismo, •giramenti di testa, •secchezza della bocca, stitichezza, vomito, flatulenza, •disturbi di erezione
- edemi alle estremità, sentirsi come sotto l'effetto dell'alcol, alterazioni dell'andatura

Effetti avversi occasionali, che possono comparire in più di 1 persona su 1000 sono:

- perdita di appetito • disturbi a livello di affettività, ansia, depressione, agitazione motoria, instabilità di umore, insonnia, •difficoltà a trovare le parole, allucinazioni, alterazione dei sogni, attacchi di panico, autismo • Disturbi del pensiero, stordimento, movimenti insoliti degli occhi, movimenti a scatto, diminuzione dei riflessi, iperattività, confusione al cambiamento dell'ambiente; aumento di sensibilità cutanea, perdita del gusto, tremori condizionati dai movimenti, disturbi di coscienza, improvvisa spossatezza, • secchezza degli occhi, gonfiore degli occhi, dolore agli occhi, abbassamento della vista, eccessiva lacrimazione • accelerazione del battito cardiaco
- rossore del viso, eritema cutaneo con senso di calore • problemi respiratori, naso otturato,
- addome flatulente, sciallorea, pirosi gastrica, diminuita sensibilità nella regione della bocca.
- sudorazione, eruzione cutanea • Perdita di forze, lesioni da cadute accidentali, sete, oppressione toracica.

Effetti avversi rari, che possono comparire in meno di 1 persona su 1000 sono:

- ipotensione, mani e piedi fredde, ipertensione • tosse, naso otturato • danno muscolare
- dolori toracici, interruzione del ciclo mestruale, • iperglicemia • aumentata sensibilità al rumore, • aritmie.

Informi il suo Medico se gli effetti avversi persistono o le creano disturbo o se insorgono degli effetti collaterali non contemplati in questo foglietto.

5. COME CONSERVARE LYRICA? Fuori della portata dei bambini in confezione originale. Non vi sono esigenze particolari per quanto riguarda la conservazione di LYRICA.

Non usare il prodotto se è scaduto.