

## **Padutin 100 KE Filmtabletten**

### **Informazioni sull'utilizzo di Padutin® 100 KE compresse rivestite**

**Proprietario dell'autorizzazione:** WABOSAN, Viena

**Produttore:**

RÖSCH & HANDEL, Viena

**Composizione:**

Una compressa rivestita contiene Kallidinogenasi (Kallikreina) con sostanze accompagnanti provenienti del pancreas suino, rispettivamente 0,075 - 16,5 mg; 100 UK (Unità di Kallikreina) corrispondono a =15,7 unità FIP.

**Proprietà ed efficacia:**

In ampi studi clinici Padutin 100 KE ha dimostrato di essere in grado di aumentare il numero e la mobilità di spermatozoi in una condizione di disturbi di fecondità maschile.

**Indicazioni:**

Disturbi di fecondità maschile dovuti a ridotto numero e/o ridotta mobilità di spermatozoi (oligozospemia idiopatica e/o asthenozospemia).

**Modalità di utilizzo:**

Le compresse possono essere ripartite nell'arco della giornata a intervalli regolari oppure assunte senza essere masticate in 3 singoli dosi circa mezz'ora prima dei pasti principali.

**Dosaggio:**

Se non è ordinato altrimenti osservare il seguente dosaggio:  
6 compresse rivestite al giorno.

**Durata del trattamento:**

La cura deve durare almeno 3 mesi. Dopo l'esame di qualità del seme sarà il Medico a decidere se proseguire la terapia per altri 3-6 mesi.

**Controindicazioni:**

Il preparato non può essere utilizzato in caso di:

-ipersensibilità nei confronti di Kallikreina.

-stati infiammatori acuti o cronici degli organi genitali

**Gravidanza e allattamento:**

Su base delle indicazioni, nessun dato.

**Effetti collaterali:**

Sporadicamente si osservano reazioni di ipersensibilità a carico della cute (eritema, prurito) e/o all'inizio del trattamento moderata diarrea. Siccome questi sintomi scompaiono quasi sempre dopo pochi giorni, perciò nella maggior parte dei casi non è necessario interrompere la terapia.

**Interazioni e effetto di tolleranza:**

Nessun conosciuto.

**Avvertimenti speciali per un utilizzo sicuro:**

Avvertire il Medico alle prime manifestazioni di effetti collaterali. Infiammazioni acute o croniche degli organi genitali possono essere la causa di disturbi di fertilità nell'uomo e possono peggiorare durante il trattamento con Padutin 100 KE. Perciò, se vi è una flogosi in atto, si deve prima trattare l'infiammazione.

Se dopo la guarigione della flogosi, la qualità del liquido seminale dovesse rimanere insoddisfacente, è indicato un trattamento con Padutin 100 KE.

La condizione prima di iniziare una terapia con Padutin 100 KE è l'astinenza da nicotina, alcol e droghe.

**Osservare la data di scadenza!**

**Conservare fuori della portata dei bambini!**

**Grandezza di confezione:**

100 compresse.

**Conservazione:**

Non superare 25°C. Tenere in un luogo asciutto. Conservare la medicina in confezione originale.

**In caso di dubbi richiedere consiglio professionale!**

® = marchio registrato della Bayer AG, Leverkusen, Germania