

Crinothermal fem®

Informazioni sull'utilizzo:

Prima di iniziare il trattamento con questo farmaco, legga con attenzione il contenuto del foglietto illustrativo.

-Conservi questo foglietto illustrativo.. Può darsi vogliate rileggerlo un domani.

-Se ha altre domande, si rivolga al Suo Medico o Farmacista.

-Questo medicinale vi è stato prescritto personalmente e non può essere dato ad altri. Esso può recare danno ad altre persone, anche se avessero gli stessi sintomi che ha Lei.

Contenuto del foglietto illustrativo:

1. Che cosa è il Crinothermal fem e quando viene impiegato?

2. A cosa bisogna far attenzione prima di usare il Crinothermal fem?

3. Come utilizzare il Crinothermal fem?

4. Quali effetti collaterali sono possibili?

5. Come conservare il Crinothermal fem?

Crinothermal fem

I componenti attivi sono Flupredniden-21-acetato e Estradiolo. 100g soluzione da impiegare sul cuoio capelluto contengono 0,025g di Flupredniden 21-acetato e 0,05g di Estradiolo. Gli eccipienti sono: acqua depurata e 2-Propanolo. Crinothermal fem viene commercializzato in confezioni da 95 ml e da 225 ml di soluzione.

1. Che cosa è il Crinothermal fem e quando viene impiegato?

1.1 Crinothermal fem è una associazione cortisonico-estrogenica in forma di soluzione da applicare sul cuoio capelluto.

1.2 Il Produttore: HERMAL KURT HERRMANN GmbH & Co OHG Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Telefon; (040) 72704-0; Telefax: (040) 7229296 www.hermal.de

1.3 Crinothermal fem può essere impiegato dalle donne per il trattamento sintomatico della flogosi estesa del cuoio capelluto che risponde ad un cortisonico di media potenza. In questo modo possono essere ridotti il numero dei capelli distrofici e la porzione dei capelli in fase di quiescenza* (telogen). *(ndt) dal dizionario medico Dorland 1-a Ed. ital. Telogen: fase di quiescenza o di riposo nel ciclo di crescita di un capello, fa seguito al catagen, in cui il capello è diventato clavato e non cresce più.

2. A cosa bisogna far attenzione prima di usare il Crinothermal fem?

2.1 Crinothermal fem non può essere impiegato:

-se Lei è ipersensibile (allergica) verso Flupredniden-21acetato, Estradiolo o uno degli eccipienti di Crinothermal fem.

- se c'è la varicella

- se ci sono processi specifici a carico della cute

- se c'è la rosacea (forte rossore in viso)

- se c'è una dermatite periorale (eczema attorno alla bocca)

- se ci sono infezioni batteriche a carico della cute.

- se ci sono reazioni da vaccinazione.

- se ci sono delle micosi.

-.se si tratta di bambine o adolescenti al di sotto di 18 anni di vita.

- se si tratta di soggetti maschi.

- in tutte le situazioni in cui non si possono usare gli estrogeni.

Siccome contiene gli estrogeni, per precauzione non si deve usare Crinothermal fem anche in seguenti condizioni

- se è presente o si sospetta un tumore estrogenodipendente e

- se vi è una emorragia dagli organi genitali di origine non determinata.

Non si deve impiegare anche nel caso ci fosse un'affezione „umida“ o acuta del cuoio capelluto.

2.2 Una particolare prudenza durante l'impiego di Crinothermal fem si richiede per i punti seguenti:

Utilizzo sul viso: Crinothermal fem non dovrebbe andare negli occhi.

Utilizzo per i periodi prolungati: Se si utilizza per un periodo più lungo di due o tre settimane, siccome la soluzione contiene degli estrogeni, si devono prendere le seguenti precauzioni:

- in presenza di una endometriosi o di una mastopatia e

- presso le donne che già fanno l'uso di preparati contenenti estrogeni, il trattamento dovrebbe avvenire esclusivamente sotto il controllo medico.

Gravidanza:

A causa del suo contenuto di estrogeni, Crinohermal fem non dovrebbe essere usato in gravidanza.

Se durante il trattamento dovesse iniziare la gravidanza, il trattamento si deve interrompere.

Riguardo ad una esposizione del feto agli estrogeni, la maggior parte degli studi oggi esistenti, non indica alcun danno al prodotto di concepimento. Per una esposizione cronica ai cortisonici, il secondo componente del Crinohermal fem, durante la gravidanza, non si possono escludere disturbi di accrescimento e danni a carico del bambino nel grembo della madre. Se Lei dovesse andare in gravidanza, è già in attesa del bambino o presume di esserlo, per favore, informi il suo Medico.

Allattamento:

Gli estrogeni possono alterare la quantità e la composizione del latte materno e come i cortisonici passano nel latte. Perciò chi è sotto il trattamento con il Crinohermal fem non deve allattare. Il trattamento con il prodotto non deve iniziare durante l'allattamento ma soltanto dopo lo svezzamento.

Capacità di guida e utilizzo dei macchinari:

Non sono richieste speciali misure di prudenza.

2.3 Interazioni con altri medicinali.

Per favore, informi il Suo Medico o Farmacista, se assume altri farmaci, da poco o cronicamente, anche se si dovesse trattare di prodotti da banco acquistabili senza la prescrizione medica.

Finora non si conoscono interazioni con altri medicinali.

3. Come utilizzare il Crinohermal fem?

Utilizzi sempre il Crinohermal fem esattamente secondo la prescrizione del Medico. Per favore, chiedi al Medico o Farmacista, se non è assolutamente sicura.

3.1 Da applicare sul cuoio capelluto.

3.2 Se il Medico non ha ordinato altrimenti, Crinohermal fem viene applicato una volta al giorno con la pipetta che si trova in confezione direttamente sul cuoio capelluto e poi massaggiato delicatamente con i polpastrelli.

Per il trattamento è sufficiente, usare 2-4 pipette riempite fino alla tacca (1 ml). Dopo il miglioramento della sintomatologia basta un trattamento ogni secondo giorno (un giorno sì, un giorno no).

La durata di trattamento è di due fino a tre settimane. Però esistono esperienze cliniche di cure protratte fino a sei mesi. Si raccomanda, di farsi controllare dal Medico curante a distanza di 3 settimane dopo il trattamento, perché i componenti del prodotto possono dare alterazioni al cuoio capelluto.

Se ha l'impressione che Crinohermal fem sia troppo o troppo poco efficace, ne parli con il Suo Medico.

4. Quali effetti collaterali sono possibili?

Come tutti i medicinali il Crinohermal fem può avere degli effetti collaterali.

4.1 In corso di un trattamento prolungato sporadicamente possono insorgere le reazioni sistemiche da estrogeni, come ad esempio è possibile la comparsa di perdite ematiche dall'utero in post-menopausa.

Raramente possono insorgere reazioni cutanee allergiche.

In generale vale per il trattamento con i cortisonici, che in corso di un prolungato utilizzo di questi farmaci possono insorgere seguenti effetti collaterali:

atrofia cutanea (assottigliamento); teleangiectasie (allargamento-distensione dei piccoli vasi cutanei), Striae distensae (striature che compaiono in seguito al danno alle fibre elastiche), acne da cortisonici; dermatite periorale (eczema attorno alla bocca); aumento della peluria (ndt. irsutismo), depigmentazione e disturbi nel bilancio ormonale causati dall'assunzione dei cortisonici.

4.2 All'insorgenza degli effetti collaterali si deve interrompere l'uso di farmaco e rivolgersi ad un Medico.

4.3 Informi il suo Medico o Farmacista se riscontri degli effetti collaterali non indicati in questo foglietto.

5. Come conservare il Crinohermal fem?

Tenere il prodotto al riparo dai bambini.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Tenere il flacone nella scatoletta di cartone e proteggere dalla luce.

Dopo l'apertura il prodotto è valido per sei mesi.

L'informazione è stata aggiornata per il gennaio 2004.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI E SPIEGAZIONI PER LE PAZIENTI:

Spettabili Signore Pazienti!

Il cortisonico contenuto in Crinohermal fem opera una veloce risoluzione del processo infiammatorio e una rapida cessazione del prurito. Crinohermal fem aumenta l'irrorazione del cuoio capelluto e perciò migliora il metabolismo.