

ROWACHOL®

(riassunto del foglietto a cura della Farmacia Vaticana, per l'uso interno della Farmacia)

Gruppo farmaceutico e indicazioni: Farmaco tradizionale per la terapia delle vie biliari.

Composizione:

Gocce: La soluzione di 100 g di gocce di "ROWACHOL-Tropfen" contiene:

levomentolo 32,0g, (-)-trans-menton 6,0 g, α -pinene 13,6 g, β -pinene 3,4g, endo-borneolo 5,0 g, cineolo 2,0 g, canfora 5g. Altre sostanze: olio di oliva.

Capsule gastroresistenti "ROWACHOL-Kapseln"

1 capsula molle contiene: stessi ingredienti come gocce, in più:

Eccipienti: olio d'oliva, gelatina, glicerolo 85%, sodio-propile-4-idrossibenzoato, sodio-etile-4-idrossibenzoato, sodio-etile-4-idrossibenzoato, complesso clorofillina-rame, sale sodico E 141.

Gruppo farmaceutico e indicazioni: Farmaco tradizionale per la terapia delle vie biliari.

Indicazioni: Farmaco tradizionale usato per migliorare la condizione dei disturbi delle vie biliari.

*Nota della Farmacia Vaticana: sensazioni di ripienezza e flatulenza e disturbi della digestione causati da insufficienza del deflusso biliare. **Se i disturbi durano più a lungo di una settimana o se la comparsa si ripete periodicamente, si deve consultare il Medico.***

Controindicazioni:

Gravi disturbi della funzione epatica, ostruzione (blocco) alla circolazione biliare, colecistite, ileo (blocco intestinale).

In caso di coelitiasi si può usare solo dopo aver sentito il parere del Medico.

In caso di nota ipersensibilità nei confronti degli oli eterici, di uno o più componenti o eccipienti del Rowachol (o delle capsule), non assumere Rowachol (capsule).

Misure di prudenza e avvertimenti per l'utilizzo:

ROWACHOL non si deve utilizzare nella gravidanza e durante l'allattamento, perché non si hanno dati sufficienti per la sua sicurezza.

Altresì non ci sono dati per l'utilizzo del farmaco per **minori sotto 12 anni e in questi Pazienti non si deve utilizzare ROWACHOL.**

Nota: consultare il Medico curante se si è in terapia con altri Medicinali.

Indicazioni per la posologia:

Se non è prescritto diversamente, la dose in gocce per adulti e per bambini sopra 12 anni

gocce: 3-5 gocce 4-5 volte al giorno

ROWACHOL Tropfen (gocce) non diluito su un po' di zucchero o 1 capsula molle gastroresistente 3-4 volte al giorno, **da assumere mezz'ora prima dei pasti.**

capsule: 1 capsula molle gastroresistente da assumere 3-4 volte al giorno **mezz'ora prima dei pasti.**

Per la durata del trattamento fare riferimento a quanto scritto nelle "Indicazioni".

Effetti collaterali:

Nei Pazienti che utilizzano ROWACHOL finora non sono stati osservati effetti collaterali. Il prodotto contiene l'olio di menta piperita. I farmaci contenenti olio di menta piperita nelle persone sensibili occasionalmente possono dare dei disturbi gastrici.

Il prodotto contiene etil- e propilbenzoato e nei Pazienti sensibili (allergiche) può far insorgere reazioni di ipersensibilità che si manifestano in forma di reazioni (irritazione) cutanee, degli occhi e delle mucose.

A causa del contenuto di formaldeide possono insorgere disturbi gastrici e diarrea.

Nota: se insorgono effetti collaterali non indicati in questo foglietto, avvisare il Medico o il Farmacista.

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Conservare sotto 25°C.

Non usare dopo la data di scadenza.

Prodotto da vendersi in farmacia.

ROWA WAGNER ®GmbH & Co. KG
Arzneimittelfabrik Frankenforster Str. 77,
D-51427 Bergisch Gladbach