

STRATTERA

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Vaticana, per l'uso interno della Farmacia)

Che cosa è STRATTERA? Strattera è un farmaco privo di proprietà stimolanti, usato nel trattamento della Sindrome di Deficit d'Attenzione/Iperattività

(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)). STRATTERA contiene come principio attivo cloridrato di atomoxetine, un inibitore selettivo della ricaptazione di noradrenalina. Questo medicinale viene prescritto come una parte del trattamento complessivo di ADHD.

Che cosa è ADHD?

ADHD ha 3 tipi di sintomatologia principali: **disattenzione, iperattività, impulsività**.

I sintomi di **disattenzione** comprendono non porre l'attenzione, fare degli errori grossolani, non ascoltare, non terminare i compiti, non eseguire gli ordini e distrarsi facilmente.

I sintomi di **iperattività** e di **impulsività** includono agitarsi, parlare troppo (straparlare), girare attorno nei momenti inappropriati e interrompere gli altri. Alcuni pazienti presentano più sintomi di iperattività e di impulsività, mentre gli altri hanno più accentuati i sintomi di disattenzione. Vi sono dei pazienti che hanno tutti i tre tipi di sintomi.

La sintomatologia di ADHD negli adulti può comprendere la mancanza di organizzazione, difficoltà ad iniziare i compiti, azioni impulsive, sognare ad occhi aperti, sonnolenza durante il giorno, lentezza nell'elaborare le informazioni, difficoltà ad imparare cose nuove, irritabilità, mancanza di motivazioni, essere troppo sensibili alle critiche (permalosità), il dimenticarsi delle cose, bassa stima di se stessi, e lo sforzo eccessivo per mantenere l'organizzazione. . Questi sintomi, quando si manifestano negli adulti, che principalmente hanno problemi di disattenzione ma non di iperattività, sono stati comunemente descritti come Sindrome da Deficit di Attenzione (Attention-Deficit Disorder (ADD)).

Molte persone, di tanto in tanto, hanno dei sintomi come quelli descritti, ma i pazienti affetti da ADHD hanno queste manifestazioni più di frequente rispetto ai loro coetanei. Per essere certi della diagnosi, i sintomi devono durare per almeno 6 mesi.

Chi non dovrebbe prendere STRATTERA? Non prendere STRATTERA se:

a) Nelle ultime 2 settimane il paziente ha fatto l'uso di farmaci del gruppo dei così detti inibitori di monoamino ossidasi (MAO-inibitori). Un MAO-inibitore è un farmaco che delle volte viene usato nella cura della depressione e per altri problemi mentali. Due esempi di questi farmaci sono Nardil® (fenelzina solfato) e Parnate® (tranilcipromina solfato). Assumere STRATTERA con un MAO-inibitore può provocare dei seri effetti collaterali o perfino può costituire il rischio per la vita. b) Il Paziente è affetto da glaucoma ad angolo acuto, una malattia dell'occhio. c) Se il

Paziente è allergico a Strattera o a qualsiasi dei suoi componenti. Il principio attivo è atomoxetine, l'elenco degli eccipienti si trova nella parte finale di questo foglietto illustrativo.

Che cosa si deve dire al Medico prima di cominciare il trattamento con STRATTERA? Prima di prendere STRATTERA parlare con il Medico se:

a) Il Paziente ha o ha avuto dei problemi epatici. Questo in tal caso potrebbe essere necessario ridurre la dose. b) Il Paziente soffre di ipertensione. STRATTERA può innalzare la pressione sanguigna. c) Il Paziente è affetto da cardiopatie o aritmie. STRATTERA può accelerare il polso (può dare tachicardia).

Riferire al Medico delle medicine che il Paziente sta prendendo o ha l'intenzione di prendere, compresi i farmaci con e senza l'obbligo di prescrizione, integratori alimentari e medicinali a base di erbe. Sarà il Medico a decidere se si può prendere STRATTERA con altre medicine. Alcuni farmaci possono alterare il modo in cui l'organismo reagisce a STRATTERA. Questo fenomeno riguarda gli antidepressivi [come Paxil® (paroxetina cloridrato) e Prozac® (fluoxetina cloridrato)], e certi altri farmaci (come chinidina). Il medico può modificare la dose di STRATTERA se il paziente sta assumendo queste medicine.

STRATTERA può cambiare il modo in cui l'organismo reagisce alla somministrazione orale o intravenosa di albuterolo (o di farmaci con simile azione), ma l'efficacia di questi farmaci non verrà modificata. Se il Paziente sta assumendo l'albuterolo, prima di prendere STRATTERA deve consultare il Medico.

Come si deve prendere STRATTERA?

Prendere STRATTERA secondo le istruzioni del Medico. Di solito il farmaco va assunto 1 o 2 volte al giorno (al mattino e nel tardo pomeriggio/la sera).

Si può assumere STRATTERA indipendentemente dai pasti.

Se il paziente si accorge di aver omesso una dose, deve prenderla al più presto, ma non si deve superare in 24 ore la dose giornaliera prescritta.

- Se STRATTERA viene preso tutti i giorni alla stessa ora, questo può aiutare a non scordarsi di assumere il farmaco.

- STRATTERA è disponibile in seguenti dosaggi: 10, 18, 25, 40, e 60 mg.

Il Paziente chiami immediatamente il Medico se ha preso una dose di STRATTERA maggiore di quella prescritta.

Altre informazioni importanti sulla sicurezza durante un trattamento con STRATTERA:

Il Paziente deve avere una particolare prudenza alla guida dei veicoli o usando dei macchinari pesanti, prima di sapere esattamente quale effetto esercita STRATTERA sulla sua salute.

Se dopo aver iniziato il trattamento con questo medicinale si dovessero notare un aumento di aggressività o dei comportamenti ostili, contattare immediatamente il medico.

La paziente deve parlare con il Medico se: a) È in gravidanza o sta pianificando la gravidanza. b) Sta allattando al seno. Non si sa se STRATTERA passa nel latte materno.

Quali sono i possibili effetti collaterali di STRATTERA?

Gli effetti collaterali più frequenti di STRATTERA impiegata nei bambini oltre 6 anni e negli adolescenti sono: disturbi gastrici; diminuzione dell'appetito; nausea e vomito; giramenti di testa; stanchezza; oscillazioni dell'umore.

Dopo aver iniziato una cura con STRATTERA può verificarsi una perdita di peso. I dati clinici dopo tre anni di trattamento indicano, che se a seguito della cura vi è una perdita di peso o una diminuzione d'accrescimento, esse sono minime. Il Medico avrà cura di sorvegliare il peso e la statura del Paziente. Se non ci dovesse essere un aumento di statura e una crescita ponderale che ci si aspetti, il Medico può cambiare la cura con STRATTERA.

Gli effetti collaterali più comuni di STRATTERA in un Paziente adulto sono: stipsi; bocca secca; nausea; calo dell'appetito; giramenti di testa; alterazioni del sonno; effetti collaterali sulla sfera sessuale; difficoltà ad urinare; crampi mestruali.

Interrompere l'assunzione di STRATTERA e chiamare subito il Medico, se il Paziente si gonfi o diventi rosso. STRATTERA raramente può dare origina a gravi reazioni allergiche.

Questo elenco di effetti collaterali non è completo. Parlare con il Medico, se compaiono dei sintomi che preoccupano il Paziente. Vedere anche: "Altre informazioni importanti sulla sicurezza durante un trattamento con STRATTERA".

Suggerimento generale circa STRATTERA

STRATTERA non è stato studiato nei bambini al di sotto di 6 anni.

I farmaci delle volte vengono prescritti per i disturbi non menzionati nei foglietti illustrativi destinati ai pazienti. Non usare STRATTERA per i disturbi per i quali non è stato prescritto. Non si deve dare arbitrariamente STRATTERA ad altre persone, anche se presentino gli stessi sintomi che ha il Paziente.

Il principio attivo di STRATTERA è atomoxetine. Eccipienti: amido pregelatinizzato, dimeticone, gelatina, lauril-soltato di sodio, FD&C Blue N°2, ossido di ferro sintetico giallo, biossido di titanio, ossido rosso di ferro e inchiostro nero commestibile.

Questo foglietto riassume le più importanti informazioni riguardanti STRATTERA. Per maggiori informazioni, consultare il medico, rivolgersi a 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o visitare il sito www.strattera.com.

Conservare a temperatura ambiente.