INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO

Vasolastine® Enzypharm, Soest, Holland

Composizione:

Ogni fiala di 2 ml contiene:

Triacylglycerol-Lipase	1.000 I.E.
Acyl-CoA-Dehydrogenase	8.000 E
MonoAminoxidase	4.000 E

Soluzione per iniezioni intramuscolari.

Indicazioni:

- A. Vasculopatie arterio- e aterosclerotiche con alterata circolazione centrale, o/e periferica o/e microcircolazione, come ad esempio la sclerosi dei vasi cerebrali (disturbi di memoria e di concentrazione, depressione, sindrome post-apoplettica, disturbi post-traumatici di circolazione cerebrale, ipotensione) coronarosclerosi (danno al miocardio, come insufficienza, angina pectoris, aritmie, condizione post-infarto del miocardio), Morbo di Buerger, Morbo di Reynaud (claudicatio intermittens, condizione post-gangrena) ipertensione arteriosa, disturbi di metabolismo di lipidi, colesterolo e acido urico (gota). Varici (sindrome post-trombotica).
- B. Insulto apoplettico (ndt.: cerebrovascolare), infarto del miocardio, gangrena, attacco di gotta.

Controindicazioni:

Patologie neoplastiche.

Vasolastine® (= Vaselastica® Neu) come tutti gli altri stimolanti cardio-circolatori, aumentando il volume di eiezione al minuto, possono stimolare la crescita tumorale.

Effetti collaterali:

Al momento presente non si conoscono.

Interazioni:

Le sostanze, che rallentano i metabolismi, come ad esempio neurolettici, tranquillanti, sedativi, barbiturici, cortisonici, preparati di Rauwolfia serpentina (ndt.: contenenti la reserpina), estrogeni, diminuiscono l'efficacia farmacodinamica di enzimi.

Dosaggio:

Se non è ordinato altrimenti: :

- Riguardo al A.: Nelle prime quattro settimane 1 (una) fiala al giorno, poi nei due mesi successivi 1 (una) fiala x 3 (tre) volte alla settimana.
- Riguardo al B.: Fino a quando non avvenga un evidente miglioramento 2-3 volte al giorno 1 (una) fiala, poi proseguire fino alla scomparsa dei sintomi con 1 (una) fiala al giorno.

In caso di una recidiva ripetere il trattamento.

Dose di mantenimento: Quando il trattamento con la Vasolastine® (= Vaselastica® Neu) viene interrotto, i fattori favorenti la sclerosi possono tornare ad esercitare il loro effetto dannoso. Perciò, in molti casi è consigliabile dopo un attacco di malattia proseguire con una terapia di profilassi con il dosaggio di 2 (due) fiale settimanalmente fino ad 1 (una) fiala ogni due settimane

Note:

1. Durante la terapia con la Vasolastine® (= Vaselastica® Neu) si prescrive una alimentazione comune, normoproteica e normosodica, anche nei soggetti ipertesi.
2. Nei pazienti diabetici in corso di una terapia con la Vasolastine® (= Vaselastica® Neu) si deve controllare regolarmente la glicemia in quanto il dosaggio di farmaci ipoglicemizzanti spesso deve essere ridotto.
3. Nella prima fase di trattamento in caso di arteriosclerosi progressiva, occasionalmente possono comparire le vertigini, le quali cessano entro le 2 ore dall'iniezione e dopo alcuni giorni di terapia non si presentano più.
4. Quando a causa di una scarsa permeabilità della parete capillare, è insufficiente l'efficacia farmacologica di un altro preparato enzimatico, (Coligaron, Rheumajecta), esso deve essere associato a Vasolastine® (= Vaselastica® Neu).
5. Per il trattamento di sintomi apoplettici o post-apoplettici (ndt.: di ictus o conseguenti ad un ictus), psicosi, demenze, demenza senile, disturbi post-traumatici di circolazione cerebrale, impotenza sessuale-
al termine del primo mese di trattamento raccomandiamo di associare o di alternare le iniezioni di Vasolastine® (= Vaselastica® Neu) e di Coliacron.
6. Terapia orale: Vasolastine® (= Vaselastica® Neu) sotto determinate condizioni, è efficace per via orale, anche se il suo effetto è diminuito. Quando risulta impossibile un trattamento iniettivo, dopo aver risciacquato la bocca si può bere lentamente il contenuto di 1-2 fiale di Vasolastine® (= Vaselastica® Neu) disciolte in un quarto o mezzo bicchiere di acqua.
In caso di disturbi di sonno e di piedi (ndt.:estremità) fredde, si deve assumere il prodotto preferibilmente alla sera, altrimenti al mattino a digiuno, 35 minuti prima del pasto (ndt.: prima della colazione).

Note particolari:

Conservare la Vasolastine® (= Vaselastica® Neu) tra 0 °C fino a 20 °C.

Evitare oscillazioni di temperatura.

Non usare Vasolastine® (= Vaselastica® Neu) dopo la data di scadenza, indicata sulla confezione con la parola „Verfallsdatum“.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Forme in commercio:

Scatole di 25 fiale da 2 ml.

Fiala pretagliata per facilitarne la rottura

Stato del- 02/03