

Venalot® Depot Compresse

(riassunto del foglietto a cura della Farmacia Vaticana, per l'uso interno della Farmacia)

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: cumarin 15 mg, troxerutin 90 mg. Eccipienti: monostearato di glicerolo, cera carnauba, giallo di chinolina E 104, stearato di magnesio, metil-idrossi-propil-cellulosa, macrogol MW= 600, polyvielen, ossido di titanio E 171, talco.

Gruppo farmaceutico: Prodotti per il trattamento delle patologie delle vene, dei vasi linfatici e dei tessuti.

Produttore: Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, 38251 Salzgitter. Tel.: (05341) 307-0, fax (05341) 307-124 info@schaper-bruemmer.de; www.schaper-bruemmer.com

Indicazioni: Conseguenze del ristagno venoso (insufficienza venosa cronica) e linfatico (linfedema). Disturbi di deflusso come accumulo di liquidi (edemi), alterazioni della cute e dei tessuti (dermatosiderosi, dermatoliposclerosi), ulcere (lesioni aperte) agli arti inferiori (ulcus crucis venosum). Flebiti (flogosi superficiale delle vene), emorroidi. Gonfiori in seguito ai traumi da sport e da incidenti (ad esempio da contusioni e distorsioni), come anche dopo gli interventi chirurgici. Secchezza della bocca dovuta all'uso delle medicine o alla radioterapia.

Proprietà: Venalot® Depot può essere utilizzato in tutte le condizioni patologiche, nelle quali si verificano dei disturbi a carico dei vasi sanguigni e linfatici e la stasi venosa e linfatica sono accompagnate dal dolore e dall'edema. Il preparato contiene i principi attivi in grado di inibire l'accumulo di liquidi su base flogistica (gli edemi) e di promuovere lo sgonfiamento e la guarigione delle ferite da traumi e chirurgiche. Essi, possono proteggere la parete vascolare dai danni, aumentano la fluidità del sangue e promuovono il drenaggio linfatico. In questo modo viene migliorata la perfusione delle reti capillari.

Venalot® Depot non influenza la coagulazione e perciò non è necessario fare dei test di laboratorio per controllarla.

Controindicazioni: Quando non si deve utilizzare Venalot® Depot?

Il farmaco non deve essere usato in corso o dopo le malattie di fegato.

Quali misure di prudenza si devono adottare? Se compaiono sintomi come nausea accompagnata da prurito, colorazione scura delle urine, colorazione giallastra (ittero) della cute e/o degli occhi (delle sclere), sospendere la somministrazione e consultare il Medico.

Interazioni: Quali altri medicinali hanno influenza sull'azione di Venalot® Depot o vengono essi stessi influenzati nel loro agire da Venalot® Depot?

Durante la contemporanea assunzione di farmaci, che possono creare danno al fegato, non si può escludere che aumenti il rischio di effetti collaterali a carico del fegato.

Posologia e modo di somministrazione: (Le indicazioni seguenti valgono se il Medico non abbia ordinato altrimenti. Se le indicazioni di posologia non vengono rispettate, Venalot® Depot potrebbe non agire come dovrebbe!) **Quanto spesso si deve assumere Venalot® Depot?** Si devono prendere 3 volte al giorno 1-2 compresse di Venalot® Depot compresse, che corrispondono alla dose giornaliera di 3 fino a 6 compresse. Le compresse vanno inghiottite intere, senza essere masticate, con un sorso di liquido.

Effetti collaterali: Occasionalmente e soprattutto all'inizio della terapia vi può essere un aumento dei valori epatici (transaminasi, gamma-GT), che torna alla normalità dopo la sospensione della cura. Sono stati riportati dei casi isolati di epatite con e senza ittero, che sono regrediti alla sospensione del trattamento. In alcuni casi singoli sono stati osservati dei disturbi del tratto gastro-enterico. Se il Paziente dovesse notare degli effetti collaterali non elencati in questo foglietto, deve riferirlo al Medico o al Farmacista.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Informazioni aggiornate per maggio 2001.

Questo medicinale è stato messo in commercio con l'autorizzazione legale transitoria. Le autorità competenti non hanno ancora concluso gli studi sulla qualità, sull'efficacia farmaceutica e sulla sicurezza. Tenere il medicinale fuori della portata dei bambini.