

Actihaemyl® Augen-Gel

(gel oftalmico)

(Riassunto del foglietto illustrativo: a cura della Farmacia Vaticana, per l'uso interno della Farmacia).

Composizione: 1 gr di gel contiene: **principio attivo:** 8,3 mg di emodializzato del sangue di vitello, privo di proteine, standardizzato chimicamente e biologicamente. Eccipienti: benzalconio cloruro, carbossimetilcellulosa sodica, sodio edetato, sorbitolo, acqua.

Forma commerciale e contenuto: 1 tubo di 5 gr di Augen-Gel o 2 tubi da 5 gr. Confezioni ospedaliere: 10 tubi da 5 gr.

Gruppo farmacologico: medicine oftalmiche/medicine per la cura delle ferite. Actihaemyl® Augen-Gel protegge i tessuti messi a repentaglio da ipossia e/o da carenza di substrati. Esso promuove la ripresa della funzionalità delle cellule, accelera e migliora la guarigione delle lesioni.

Produttore:

Pharma Stulln GmbH Werksstrasse 3;
92551 Stulln. Telefon (0 94 35) 30 08-0
Telefax (09435)3008-99 E-mail

info@pharmastulln.de

Internet www.pharmastulln.de

Indicazioni: ulcere corneali di diverse origini (lesioni della cornea). Lesioni corneali (erosioni) da agenti corrosivi (alcali e acidi). Flogosi corneali da cause diverse (cheratite bollosa e neuroparalitica). Prevenzione e trattamento dei danni da radiazioni (raggi UV, raggi X e altre potenti radiazioni ad onde corte). Alterazioni degenerative a carico della cornea e del tessuto connettivo. Trattamento dopo il trapianto di cornea.

Controindicazioni:

Quando non si può utilizzare Actihaemyl® Augen-Gel? Finora non si conoscono controindicazioni.

Misure precauzionali e avvertimenti:

Quali precauzioni si devono osservare? Per ora non si conosce alcuna.

A che cosa si deve fare attenzione alla guida dell'automobile o mentre si utilizza dei macchinari senza un sicuro appoggio?

Appena applicato il gel oftalmico, la vista può risultare sfuocata. Perciò si dovrebbe evitare per almeno 20 minuti dopo l'applicazione di condurre autoveicoli e di utilizzare i macchinari.

Interazioni di Actihaemyl® Augen-Gel con altri medicinali: Non si conoscono interazioni

con altri medicinali. Informare il Medico se si devono utilizzare altri medicinali oftalmici.

Posologia, modalità e durata di trattamento:

Le seguenti indicazioni sono da considerare se il Medico curante non disponga altrimenti l'utilizzo di Actihaemyl® Augen-Gel.

Osservare esattamente la posologia prescritta, altrimenti Actihaemyl® Augen-Gel potrebbe non agire in modo corretto!

Quanto di Actihaemyl® Augen-Gel e quanto spesso lo si deve utilizzare?

Istillare più volte al giorno 1 goccia di Actihaemyl® Augen-Gel.

Come e quando utilizzare Actihaemyl® Augen-Gel?

Actihaemyl® Augen-Gel va applicato nel sacco congiuntivale dell'occhio malato. Si deve richiudere il tubo subito dopo l'utilizzo.

Per quanto tempo si deve utilizzare Actihaemyl®- Augen-Gel ?

La durata di trattamento dipende dall'estensione (dal grado) della lesione. Actihaemyl®- Augen-Gel deve essere utilizzato fino alla guarigione.

Errori di somministrazione e sovradosaggio:

Che cosa si deve fare, se è stata applicata la quantità eccessiva di Actihaemyl® Augen-Gel? Non si conoscono casi di sovradosaggio.

Che cosa si deve fare, quando si dimentica una somministrazione?

Quando il Paziente si dimentica di utilizzare la medicina, alla successiva somministrazione utilizzare la dose prescritta (la solita quantità) di Actihaemyl® Augen-Gel.

Effetti collaterali:

Quali effetti avversi possono manifestarsi durante il trattamento con Actihaemyl® Augen-Gel?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali. Se il Paziente dovesse osservare degli effetti collaterali, deve avvisare il Medico o il Farmacista.

Indicazioni e informazioni circa la scadenza del medicinale:

La data di scadenza di questa confezione è impressa sulla scatoletta e sul tubetto deformabile. Non utilizzare il medicinale dopo questa data!

Oltre quattro settimane dall'apertura del tubetto, non si deve più utilizzare Actihaemyl® Augen-Gel.

Stato di informazioni: marzo 2002.