

## **Wobenzym® N compresse gastroprotette**

(riassunto a cura della farmacia vaticana, per l'uso interno della farmacia)

### **1 cpr gastroprotetta contiene seguenti principi attivi:**

- pancreatina (maiale)=100 mg (300 Ph.Eur.-Protease)
- tripsina (maiale)=24 mg (12 µkat) ●chimotripsina(bovina)=1 mg(5µkat)
- Bromelain=45 mg (225 F.I.P.-E.) ●Papain=60 mg (164 F.I.P.-E.)
- Rutosid 3 H<sub>2</sub>O =50 mg
- (proteolyt. Gesamtakt. = 940 F.I.P.-E. secondo metodo di Papaina)

**Altri componenti (eccipienti):** Lattosio 1H<sub>2</sub>O, saccarosio, amido di mais, acqua purificata, , stearato di magnesio, Macrogol 6000, silicio biossido altamente dispersivo, cellulosa microcristallina, talco, , calcio carbonato, acido metacrilico-metilmacrilato-copolimero (1:1), gomma lacca, biossido di titanio (E 171), argilla bianca, giallo di chinolina (E 104), eritrosina (E 127), povidone, trietilcitrato, cera candeggiata, cera carnauba, vanilina.

### **Indicazioni:**

- Processi infiammatori a carico delle vene (tromboflebiti)  
Altri processi flogistici, per esempio: - infiammazioni a livello di gola-naso-orecchio, come sinusiti, otiti medie  
- infiam. delle vie respiratorie, come bronchiti  
- infiam. dell'apparato urinario e sessuale  
- infiam. delle vene e dei vasi linfatici; disturbi di perfusione  
- flogosi da artrite reumatoide  
- flogosi post-traumatica, come contusioni, strappi, distorsioni  
- flogosi cutanee come ustioni, escoriazioni, lacerazioni e ferite da taglio, ferite operatorie, ulcere degli arti inferiori  
- edemi di origine flogistica  
- flogosi dopo la radioterapia

### **Quando non si deve somministrare Wobenzym® N?**

Non assumere se vi è ipersensibilità nota nei confronti di principi attivi, del frutto di ananas o di papaya o qualsiasi di eccipienti.

### **Quando si deve consultare il Medico prima di assumere**

**Wobenzym® N ?** Se il Paziente soffre di gravi disturbi di coagulazione (per esempio emofilia, epatopatie gravi, dialisi) o assume degli anticoagulanti. Chiedere il Medico se si può assumere Wobenzym® N prima o dopo interventi chirurgici.

**Durante la gravidanza e l'allattamento:** non utilizzare Wobenzym® N, perché manca sufficiente esperienza clinica.

**Misure di prudenza per l'utilizzo e avvertimenti:** Wobenzym® N, anche assunto in alti dosaggi, non altera la capacità di reazione. Non c'è perciò nessun rischio aggiunto per chi si mette alla guida del automobile o fa dei lavori senza un sicuro appoggio.

**Di cosa inoltre bisogna tener conto?:** In alcuni Pazienti, all'inizio del trattamento vi può essere un aumento della sintomatologia dolorosa. In questo caso si deve ridurre la posologia e chiedere il consiglio al Medico. Se il Paziente che assume Wobenzym® N, medicina, che può rendere il sangue più fluido, deve sottoporsi ad un intervento chirurgico, deve dire al Medico Operatore che ha fatto l'uso di questo farmaco.

**Diabete e altri disturbi metabolici:** Una cpr gastroprotetta di Wobenzym® N contiene 0,2 g di saccarosio. Ad ogni assunzione, a seconda della dose, vengono introdotti fino a 2 g di saccarosio. Perciò Wobenzym® N non è adatto per i Pazienti con intolleranza ereditaria al glucosio, disturbi di captazione di glucosio e di galattosio o con carenza di enzimi degradanti saccarosio o isomaltosio.

**Interazioni con altri farmaci:** Se Wobenzym viene assunto assieme alle tetracicline, le concentrazioni dell'antibiotico nel plasma e nelle urine vengono innalzate. Tenere presente che questo fenomeno può verificarsi anche quando la terapia con il farmaco è stata iniziata da poco.

### **Posologia, modo e durata di trattamento di Wobenzym®N:**

Le presenti indicazioni valgono, se il Medico non abbia ordinato altrimenti. Seguire la posologia prescritta, altrimenti Wobenzym® N può non avere giusta efficacia.

Per il trattamento delle flogosi, il dosaggio per un Paziente adulto consiste, a seconda della gravità della malattia, di 3x2 fino a 3x6 compresse gastroprotette al dì. Se è necessario, si può aumentare il dosaggio fino a 30 compresse gastroprotette al dì.

### **Come e quando assumere Wobenzym® N ?**

Assumere le compresse gastroprotette 1/2-1 ora prima dei pasti. Le compresse vanno ingoiate intere, con sufficiente liquido.

### **Per quanto tempo continuare la terapia con Wobenzym® N?**

Continuare la cura fino alla completa scomparsa della sintomatologia.

**Errori di posologia e sovradosaggio** (intenzionale o per errore): Che cosa fare quando sono state assunte troppe compresse di Wobenzym® N? Se vengono assunte dosi eccessive è probabile che gli effetti avversi si manifestino con maggior intensità. Non si richiedono, comunque, misure particolari.

**Che cosa fare, quando si è assunto troppo poche compresse di Wobenzym® N? o quando è stata dimenticata una dose?** Semplicemente, prendere la dose successiva al giusto orario, senza aumentarla.

### **Quali effetti collaterali possono insorgere durante la cura con Wobenzym® N?**

Spesso i Pazienti lamentano di sentirsi come se avessero lo stomaco pieno, i gonfiori addominali, a volte anche la nausea. Raramente insorgono reazioni allergiche, come per esempio rash cutaneo, che regrediscono dopo la sospensione della medicina.

Nei casi isolati, in particolare nelle Persone allergiche, possono verificarsi gravi reazioni allergiche fino allo shock anafilattico. Spesso vi può essere un'innocua modificazione della consistenza, del colore o del odore delle feci, occasionalmente insorge la diarrea.

Non si può escludere una diminuzione della capacità di coagulazione di sangue.

**Misure da attuare alla comparsa degli effetti avversi:** Interrompere immediatamente l'assunzione e consultare il Medico.

**Come conservare Wobenzym® N?** A temperatura ambientale, sotto i 25°C. **Non usare dopo la data di scadenza!**

**Stato di informazioni:** Aprile 2003.

### **Meccanismo d'azione:**

Gli enzimi controllano quasi tutti processi vitali e svolgono un ruolo importante nella regolazione del sistema immunitario. Se la loro attività e la loro produzione sono insufficienti, possono insorgere seri conseguenze, problemi di salute e malattie croniche. Wobenzym® N è una associazione mirata di enzimi naturali e di rutoside (rutina) di origine vegetale. Gli enzimi accelerano la disgregazione di prodotti metabolici coinvolti nei processi flogistici. Rutoside normalizza la permeabilità vascolare, accelerando la rimozione degli edemi e degli ematomi. Wobenzym® N diminuisce la viscosità del sangue, che altrimenti potrebbe determinare la formazione dei coaguli, migliora la fluidità del sangue e con questo anche la microcircolazione. Usando il prodotto, i processi infiammatori e edemi regrediscono velocemente e migliora la perfusione. Questo elimina i dolori e accelera la guarigione. La costante nel tempo qualità degli enzimi contenuti nel Wobenzym® N è garantita dalle procedure di standardizzazione. L'attività enzimatica viene espressa in unità specifiche (per esempio F.I.P.-E.; µkat).